

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Grandes Cultures

Bulletin Technique n° 32 du 14 octobre 2008 - 1 page

Actualité

COLZA : 4 à 8 feuilles en moyenne.
CEREALES : coléoptile à 1 feuille pour les semis de début octobre

Colza

Ravageurs

La situation **pucerons** reste très hétérogène. On a un peu plus de situations ayant dépassé le seuil de 20% de plantes porteuses, que la semaine dernière (et un peu plus de pucerons par plante), mais il reste encore une majorité de parcelles peu ou pas touchées. Dans certaines situations, on trouve des pucerons cendrés, parfois localisés au cœur de la plante.

Des captures de **grosses altises** sont enregistrées sur pratiquement tous les sites, mais les niveaux ne sont importants que dans quelques cas : ex Varreddes (77), Saint Martin de Brethencourt (78), Arthieul (95)…Les conditions chaudes de ce week end ont permis le vrai démarrage du vol de **charançon du bourgeon terminal**, avec des captures relevées dans les 2/3 des cuvettes du réseau. La ponte démarre en général une dizaine de jours après la sortie, d'autant plus que les températures baissent.
On enregistre aussi un vol de baris (non nuisible à l'automne).

Pour les pucerons, un grand nombre de parcelles sont suffisamment développées pour pouvoir supporter les infestations. L'attention doit se focaliser sur les colzas moins avancés (4-5 feuilles) ou freinés par des conditions sèches, si le seuil de 20% de pieds porteurs est dépassé . Pour les ravageurs à nuisibilité plus aléatoire (grosses altises et charançon du bourgeon terminal), ce sont également les colzas les moins avancés qui pourraient être exposés selon l'évolution du vol.

Maladies

Sur le plan des maladies, la situation est toujours globalement satisfaisante. Le phoma est très peu présent, avec de rares situations à 5-10% de pieds porteurs de macules. Quelques étoiles d'oïdium viennent d'apparaître, dans le centre Seine et Marne (Crisenoy et Touquin sur variété ES Artist) et à Janvry (91).

Céréales

Les quelques pièges cicadelles mis en place sur des parcelles levées dans le Val d'Oise, le centre et le nord Seine et Marne indiquent des captures assez faibles (<10), à l'exception du site de Vigny (95) avec 35 captures (proximité de bois). Quelques pucerons sont déjà visibles (<1% des pieds). A suivre.

Maïs

Alors que les récoltes sont bien avancées, il convient de rappeler que la lutte contre les pyrales et les fusarioses pour la prochaine campagne, commence dès la récolte des maïs. En effet, le broyage rapide des résidus de récolte permet une réduction de plus de 50% des populations larvaires. La technique la plus complète est l'association du broyage et du labour qui permet une décomposition rapide des résidus, porteurs éventuellement de fusariose, et supprime le refuge des larves diapausantes. Pour être complètement efficace, cette lutte devrait être mise en œuvre de façon collective, notamment dans les zones à forte pression pyrale (ex certains secteurs du nord Vexin, et dans les Yvelines).

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE

Publication périodique
C.P.P.A.P
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2008
87 euros (papier)
76 euros (fax)
68 euros (mail)